

鼠径ヘルニア根治術

主治医		指示受け NS	
-----	--	------------	--

手術日	平成	年	月	日
血型 型 Rh (+ -) 感染症 HCV (+ -) HBs (+ -) WaR (+ -)				
最終VS 体温 () 脈拍 () 血圧 ()				
身長 ()cm 体重 ()kg 洗腸後反応便 ()				
家族調査結果				

経過	手術決定時または入院当日	手術前日	手術当日・術前	手術当日・術後	手術後1日目
月 日	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
目標達成	☆病状・治療に関する説明と同意 ☆入院生活・手術に対する不安・疑問の解消			☆合併症の早期発見と適切な対応	☆創痛の緩和と早期離床
処置		○シャワー ○除毛(臍下部～陰部)臍処置 ○血管確保(18Gサーフロ 左前腕) ○ネームバンドの着用	○7時 グリセリン洗腸 120ml ○入室30分前 前投薬 ○弾性ストッキング着用 ○術衣の更衣		○歩行可であればBa抜去
点滴・注射			○9時～アクチット500ml 80ml/hで開始 ○セファメジンα 1P・ザンタック 1Aを手術室に持参 ○前投薬 【□硫酸アトロピン0.5mg 1A im】 【□アタラックスP25mg 1A im】 【□ 】	○OST _s 500 80ml/h × 2本 1本目にザンタックA追加 【□】○糖尿病患者のみHu-R 【□】単位混注 ○セファメジンα × 1P施行	○OST _s 500 80ml/h × 2本 終了後ロック 【□】○糖尿病患者のみHu-R 【□】単位混注 ○セファメジンα × 2P施行
検査	○血1 T - bil GOT GPT BUN Cre CRP Na K Cl Alb PT APTT 胸腹部X-P ○血型 (未の場合)				○血1 T - bil GOT GPT BUN Cre CRP Na K Cl
薬	○手術前中止薬 (抗凝固剤等) 【□】中止日 / 【□】中止日 /	○手術前中止薬確認 ○21時 センノサイド2錠内服	○内服中止 ○6時 降圧剤内服(水少量) 【□】 【□】		○常用薬再開 ○抗凝固剤再開
安静度	○制限なし	○制限なし ○リハビリ中止	○前投薬後車椅子	○床上安静 体位変更可	○歩行可
食事	○通常食	○21時以降絶飲食			○朝～通常食
清潔	○入浴または清拭		○髭剃り		○モーニングケア
排泄	トイレ使用			バルン挿入中	○バルン抜去後トイレ使用
観察	○VS 1 検/日 ○身長体重測定 ○既往歴の有無 ○日常生活動作 (援助 要・不要) ○手術に関する言動、理解度	○VS 1 検/日 ○手術に関する言動、理解度	○術前VS ○前投薬後VS ○排便 (有・無)	○VS・尿測(帰室時, 1時間後, 3時間後, 6時間後, 9時間後) ○麻酔覚醒状態 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS 2 検/日 ○創傷の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無 ○バルン抜去後尿測不要
教育・指導	【□】手術説明 ○術前オリエンテーション ○禁煙指導・トリフロー訓練 ○服薬指導				
書類	○患者用CPの配布と説明 【□】手術承諾書 【□】手術申込書 【□】手術準備書				
バリアンス	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無
サイン					