

鼠径ヘルニア根治術

経過	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	退院日
月 日	/	/	/	/	/	/	/
目標達成		☆退院に向けたADL 向上					
処置	○カラヤ除去 (以後オープン)					○全抜鉤	
点滴・注射	○セファメジンα × 2P	○セファメジンα × 2P	○セファメジンα × 2P				
検査		○血1 T-bil GOT GPT BUN Cre CRP Na K Cl 胸腹部X - P				○血1 T-bil GOT GPT BUN Cre CRP Na K Cl	
薬							
安静度							
食事							
清潔	○シャワー可 フィルム使用						
排泄							
観察	○VS2検/日 ○創傷の有無・ 創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS2検/日 ○創傷の有無・ 創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS1検/日 ○創傷の有無・ 創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS1検/日 ○創傷の有無・ 創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS1検/日 ○創傷の有無・ 創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS1検/日 ○創傷の有無・ 創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○VS1検/日
教育・指導						○退院指導 退院後の生活について	
書類							
バリアンス	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
サイン							

術後・臨時指示	BT	38.5℃以上の場合	血液培養		嘔気・嘔吐時
B Pコントロール目標 () ~ ()		①	要 不要		①
() mmHg以上		②			②
①	Spo ₂	() 以上 Keep			疼痛時
②		O ₂ () ℓ ~ MAX () ℓ		①	
③		FiO ₂ () % ~ MAX () %		②	
() mmHg以下		O ₂ off (可 ・ 不可)			不眠時・不穏時
①	尿量	/ () 時間毎 () ml以下			①
②		/ () 時間毎 () ml以下			②
③		/ () 時間毎 () ml以下			その他
		①	投薬指示		
		②			