

胃切除術

経過	9 日目	10 日目	11 日目	12 日目	13 日目	14 日目	日目	経過
月 日	/	/	/	/	/	/	/	月 日
目標達成								目標達成
処置	○ガーゼ交換 ○ドレン抜去	○ガーゼ交換	○ガーゼ交換 (浸出液なくなるまで)					処置
点滴・注射	○○○パレセーフ500ml ×3本/日 1本目 塩酸チアミン1A 2本目 パンテニール1A 3本目 ペラプリン1A	○○パレセーフ500 ×2本/日 「□」○糖尿病患者のみ Hu-R「□」単位 混注	○○パレセーフ500 ×2本/日 「□」○糖尿病患者のみ Hu-R「□」単位 混注 80ml/h 終了後ロック					点滴・注射
検査	【□】○糖尿病患者のみ Hu-R							検査
薬	【□】単位混注							薬
安静度								安静度
食事	○3分粥	○朝～5分粥開始	○5分粥	○朝～7分粥	○朝～全粥	○朝～通常食		食事
清潔	○シャワー可 フィルム使用 (ドレン・エビ抜去後)							清潔
排泄								排泄
観察	○V S 2検/日 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無 ○ドレン排液の性状・量	○V S 2検/日 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無 ○ドレン排液の性状・量	○V S 2検/日 ○創痛の有無・創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S 2検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S 1検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S 1検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	○V S 1検/日 ○創痛の有無 ○創部観察 ○腹部症状 ○排ガス・便の有無	観察
教育・指導							○退院指導	教育・指導
書類								書類
バリエーション	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	バリエーション
サイン								サイン

術後・臨時指示	BT	38.5℃以上の場合		血液培養		投薬指示	嘔気・嘔吐時
		①	②	要	不要		
B Pコントロール目標 () ~ ()		() 以上 Keep				① ② ③	嘔気・嘔吐時 ① ②
() mmHg以上	Spo ₂	O ₂ () ℓ ~ MAX () ℓ FiO ₂ () % ~ MAX () % O ₂ off (可 ・ 不可)					疼痛時 ① ②
① ② ③ () mmHg以下	尿量	/ () 時間毎 () ml以下 / () 時間毎 () ml以下 / () 時間毎 () ml以下					不眠時・不穏時 ① ② その他
① ② ③		① ②					